Désinfectant de choc pour l'élevage

Homologué bactéricide, fongicide, virucide

DÉSOGERME MICROCHOC

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

- Large spectre : bactéricide : Gram positif et Gram négatif, mycobactéries, Listeria, fongicide : moisissures, levures, virucide: H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, peste porcine, bactériophages.
- Peut être utilisé *en présence des animaux* (voir conditions d'utilisation).
- Non mutagène (Mutatest d'Ames).

DOSES ET USAGES

Bactéricide à 0,25%, (contact 5 mn), fongicide (contact 15 mn) et virucide (contact 30 mn) à 2%.

- Matériels de transport, d'élevage et logements d'animaux domestiques.
- Thermonébulisation: 1,5 ml/m3, contact pendant 4 h.

SECURITE

- Bactéricide à très large spectre : bactéries Gram + et Gram -, mycobactéries, listéria..., Fongicide moisissures et levures, Virucide H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, peste porcine et bactériophage.
- Répond aux Normes AFNOR de désinfection, bactéricide, fongicide et virucide NFT 72 301, 72 181. (de 0.25 à 2%) et au test virucide pour agrément DSV.
- Actif en présence d'eau dure et de matières protéiniques. Pas d'accoutumance des microorganismes.
- DL 50 = 1900 mg/Kg (chez le rat par voie orale),
- Homologation n° 2000161 par le Ministère de l'Agriculture, service de la protection des végétaux pour les traitements bactéricides, fongicides, virucides.
- Corrosif : contient du glutaraldéhyde.
- Les composants de **DESOGERME MICROCHOC** sont dans la liste de l'Arrêté Ministériel du 8/9/99, nettoyage de matériaux pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Le port de gants, lunettes et masques de protection est fortement recommandé.

MODE D'EMPLOI:

1. Pour les matériels et locaux en l'absence des animaux :

Vide sanitaire, véhicule...:

- Nettoyage préliminaire avec **AGRINET MOUSSE**, **AGRINET DSM**.
- Désinsectisation avec PARASECT ELEVAGE 3 ou PARAMOUCHE.
- Désinfection par aspersion ou trempage avec machine à pression, Atomist... sur murs, sols, mangeoires, véhicules, matériels divers : diluer DESOGERME MICROCHOC de 0,25 à 2 % dans l'eau (1/400 à 1/50).

Pédiluves, rotoluves: renouveler 1 fois/semaine la solution diluée de DESOGERME MICROCHOC à 0,25% (1/400).

En thermonébulisation ou en nébulisation à froid : diluer 1 litre de DESOGERME **MICROCHOC** dans 3 litres d'eau pour traiter environ 1000 m³.

2. Pour les matériels et locaux en présence des animaux :

En désinfection d'entretien, **DESOGERME MICROCHOC** dilué de 0,25 à 2% (1/400 à1/50) dans l'eau peut être pulvérisé sur sols, murs et parois, avec les matériels PULBAN ou PULDOS, en évitant soigneusement de diriger le jet dans la direction, au dessus ou à proximité des animaux et de leurs aliments



Succursale: 6, Rue Aboubaker Essedik - 1002 Tunis Tél : (+216.71) 849 546 - Fax : (+216.71) 283 850

E-Mail: aci@topnet.tn Site Web: www.acitunisie.com.tn

Unisie Siège social : Z.I Medjez El Beb 9070 Béja Tél :(+216) 78 562 924 Fax: (+216) 78 562 925